

น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ Crocodile Cement Remover



จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ขจัดคราบซีเมนต์

คุณสมบัติ

น้ำยาจะทำปฏิกิริยากับคราบปูน, ยาแนว, หรือปูนพองจากการก่อสร้างที่สะสมบนพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาในการทำทำความสะอาดพื้นที่ หลังการติดตั้งกระเบื้อง โดยไม่ทำลายพื้นผิวหน้าของกระเบื้อง ควรสวมถุงมือทุกครั้งก่อนใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ที่ต้องการจะขจัดคราบซีเมนต์ ยาแนว ปูนขาว นั้นต้องแห้งเต็มที่

อัตราส่วนผสม

กระเบื้องเคลือบเงา และพอร์ซเลน	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
กระเบื้องดินเผา	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 5
พื้นหินธรรมชาติ, หินสังเคราะห์	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
พื้นหินที่สามารถทนต่อกรดได้	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 15

การใช้งาน

1. ใช้ลงบนพื้นผิวโดยตรง หรือเจือจางด้วยการผสมน้ำ ขึ้นอยู่กับคราบของปูน
2. ต้องแน่ใจว่าคราบปูนที่ต้องการขจัดนั้นแห้งเต็มที่
3. ใช้แปรงทองเหลือง หรือที่ทำความสะอาดที่มีความแข็ง ขจัดคราบปูนบางส่วนออก
4. เทน้ำยาที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ 4-5 นาที
5. ล้างออกด้วยน้ำเปล่า ถ้าคราบออกไม่เพียงพอ ให้ทำซ้ำ



น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ Crocodile Cement Remover



จระเข้
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

Hydrochloric acid 10 < 15 %
PH.1

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้ กับพื้นผิวที่ไม่ทนต่อกรด
- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือ และแว่นเพื่อป้องกันตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันพุ่งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากากในกรณีหมดสติ ควรจัดทำทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม คลายกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ในสถานที่ปลอดภัยโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ชักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดทำให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆ ใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยและถ่ายเท คลายกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มืดซิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง
ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่พสน้ำ)
0.5 ลิตร	4 ตร.ม.
3.0 ลิตร	24 ตร.ม.
10.0 ลิตร	80 ตร.ม.
20.0 ลิตร	160 ตร.ม.

สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้